

FICHA TÉCNICA

Gránulos Dispersables (WG)
Fipronil / 800 g/kg
Insecticida
Uso agrícola
Registro Nacional No. 2592
Titular del registro: Bayer S.A



Cazador®

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:
Fipronil / 800 g/kg
Ingredientes aditivos:
c.s.p. 1 kilogramo

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

No aplique durante la floración ni cuando se constate actividad de abejas. Uso de equipo de protección personal al manipular y usar el producto. CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CAZADOR® 80 WG con ingrediente activo Fipronil (Grupo 2B: INSECTICIDAS) es un insecticida que actúa por contacto e ingestión presentando una excelente actividad biológica sobre insectos perforadores, chupadores y masticadores.

Como los principales grupos de insecticidas, el Fipronil actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, más específicamente el compuesto es activo sobre el canal GABA, regulador del cloro. Insectos resistentes o tolerantes a los piretroides, ciclodienos y organofosforados, no tienen resistencia cruzada al Fipronil, siendo **CAZADOR® 80 WG** un producto efectivo para los programas de manejo de resistencia.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	¹ P.C.	² P.R.
ORNAMENTALES**				
ROSA	Trips <i>Frankliniella occidentalis</i>	0.12 gr/L Máximo 120 gr /ha	N.A	4 horas

N.A No Aplica

¹P.C. **Periodo de carencia:** Tiempo entre la aplicación y la cosecha.

²PR: **Periodo de reentrada:** tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas y/o animales al área o cultivo tratado. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido. Una vez finalizado el mismo podrán reingresar utilizando elementos de protección personal, como pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado; para las labores que impliquen contacto de las manos con el área tratada, se debe usar adicionalmente guantes y en ambientes confinados (invernaderos) respirador o máscara.

* Se llevó a cabo prueba de Selectividad en Rosa, Clavel y Crisantemo.

** Debido al alto número de especies ornamentales, que dificultan el desarrollo de pruebas de eficacia agronómica para el registro de este plaguicida en cada una de ellas, el usuario asume la responsabilidad del uso del producto en las especies de flores y plantas ornamentales no indicadas en el cuadro de uso, para lo cual deberá realizar una prueba preliminar con el objeto de evaluar el riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada.



FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

FISSIIIIII **Ornamentales:** Realizar aplicación en aspersión foliar, con volúmenes de aplicación de 1000 litros de agua por hectárea.

CAZADOR® 80 WG debe ser aplicado dentro de un programa de rotación con otros insecticidas de diferente mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Insecticidas - IRAC y complementando con prácticas de manejo integrado de cultivo (prácticas culturales adecuadas para el control de la plaga, variedades tolerantes, moderadas densidades de siembra, control de malezas y enfermedades).

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Antes de realizar mezclas con CAZADOR® 80 WG deben realizarse previamente pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar (miscibilidad y fitocompatibilidad) en pequeña escala.

CAZADOR® 80 WG en las dosis y frecuencia recomendadas es compatible con los cultivos registrados. Si embargo se recomienda realizar pruebas de fito-compatibilidad en nuevas variedades y/o híbridos.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

- PUEDE SER LETAL SI ES INHALADO, NO RESPIRE (POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN)
- CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS
- **Evite el contacto con la piel y la ropa.**
- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular y mezclar el producto: guantes, camisa manga larga, pantalón largo y zapatos resistentes; para aplicar e ingresar al área tratada antes de terminar periodo de reentrada: camisa manga larga, pantalón largo y zapatos resistentes. Si necesita realizar alguna actividad que esté en contacto con la superficie tratada use guantes.
- **No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.**
- Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.
- No emplear utensilios domésticos para medir o mezclar el caldo de aspersión. Usar instrumentos de medición adecuados y previamente marcados para su fácil identificación. No mezclar el producto o la mezcla con la mano. Verificar el buen estado del equipo de aplicación y calibrelo previamente. No sople con la boca las boquillas obstruidas; utilice un cepillo para destaparlas.
- No permita animales en el área tratada.
- **Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No re-envase el producto.**
- No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).
- **Transpórtelo solamente con productos agroquímicos, separado de productos de consumo humano y animal.**

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (aserrín o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y desecho acorde con la entidad local competente.
- No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar. Lave el equipo en el sitio de la aplicación y desecho esta agua en el área tratada.
- No contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos o envases vacíos.
- **No realizar aplicaciones aéreas.**
- **Extremadamente tóxico para organismos acuáticos.**
- **Extremadamente tóxico para aves.**
- **ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO APLICAR EN PRESENCIA DE ABEJAS Ó POLINIZADORES Ó CERCA DE ENJAMBRES.** La aplicación debe realizarse cuando se garantice que no hay presencia de abejas. Puede matar insectos polinizadores. **“No aplicar este producto en presencia o actividad de insectos polinizadores O EN ÉPOCA DE FLORACIÓN del cultivo o las malezas.**
- **Aplicar temprano en la mañana o al final de la tarde.**
- **Si existen apiarios cercanos informe previamente al apicultor.**
- Respetar las franjas de seguridad en relación a cuerpos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquiera otra área que requiera protección especial, 10 metros (terrestre).
- **Lleve el envase al centro de acopio más cercano del programa campo limpio, luego de realizar el triple lavado.**

EN CASO DE INTOXICACIÓN, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM:

LÍNEA 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL TEL. (091) 2 88 60 12.
LÍNEA BAYER S.A DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.

Categoría toxicológica: II Moderadamente Peligroso - Dañino
*Clasificación Recomendada por la Organización Mundial de la Salud.

Formulado por:

Bayer S.A.S. Bayer CropScience
Línea 018000111212
Bogotá, D.C, Colombia
®Marca Registrada

