

||||| FICHA TÉCNICA

Concentrado Emulsionable (EC)
Isoprothiolan /400 g/L
Fungicida
Uso agrícola
Registro Nacional No. 1587
Titular del registro: Bayer S.A



Fudiolan®



COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:
Isoprothiolan /400 g/L
Ingredientes aditivos:
c.s.p. 1 litro

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Al usar el producto, leer y seguir las instrucciones de la etiqueta. Al momento de manipular usar equipo de protección personal. CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO

FUDIOLAN® EC 40 es un fungicida sistémico, con efecto preventivo cuando se aplica antes de la aparición de la enfermedad y con efectos curativos cuando la aplicación se hace con incidencia de la misma.

FUDIOLAN® EC 40 en aplicaciones foliares muestra un efecto preventivo no solamente sobre las hojas tratadas sino también sobre las hojas nuevas formadas seis días después de su aplicación.

FUDIOLAN® EC 40 puede ser traslocado desde las raíces hasta las hojas en aplicaciones al suelo o movilizado en el área foliar en aplicaciones al follaje dando una protección óptima de 14 días.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	1P.C.
ARROZ	Piricularia Pyricularia oryzae	1.0-1.5 L/ha	12 horas

1PR: Periodo de reingreso: periodo restringido (no prohibido) entre la aplicación y la re-entrada del personal al área aplicada (ver tiempo en cuadro), siempre verifique que la superficie foliar este seca. Si requiere realizar alguna labor antes de cumplirse el periodo de re-ingreso (ej. monitoreo de la aplicación), debe utilizar overol, botas y guantes.

||||| FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

FUDIOLAN® EC 40 se puede aplicar tanto por vía aérea como terrestre utilizando desde 30 hasta 300 litros de agua por hectárea, dependiendo del equipo de aplicación. Se puede aplicar también con equipos aspersores de motor para espalda.

Para la mezcla con otros plaguicidas se requiere una prueba de premezcla a nivel local en pequeñas cantidades antes de colocar el producto en el tanque aspersor.

En todos los casos de mezcla se requiere primero llenar el tanque con agua hasta la mitad. En un recipiente aparte se hace la premezcla del otro plaguicida y se agrega al tanque. Por último agregue el FUDIOLAN® EC 40 y termine de llenar con agua el tanque aspersor.

Se recomienda hacer dos aplicaciones en la siguiente forma:

Primera: Con la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad aproximadamente 30 a 50 días después de germinación.

Segunda: Con el inicio del espigamiento (5%).





COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Antes de efectuar mezclas debe realizarse previamente pruebas de compatibilidad (miscibilidad) y fito-compatibilidad con el producto que se desea mezclar.

FUDIOLAN® EC 40 en las dosis y frecuencia recomendadas, es compatible con los cultivos registrados, sin embargo se recomienda pruebas de fito-compatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos.

FUDIOLAN® EC 40 es incompatible con plaguicidas que presenten reacción alcalina.

////// PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular, aplicar el producto; y para ingresar al área tratada antes de terminar el periodo de re-entrada.
- **No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.**
- **Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.**
- Verificar el buen estado del equipo de aplicación y calíbrelo previamente.
- No sople con la boca las boquillas obstruidas; utilice un cepillo para destaparlas.
- Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua en el área tratada.
- No permita animales en el área tratada.
- **Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No re-envase el producto.**
- No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).
- Transpórtelo solamente con productos agroquímicos, NO con productos de consumo humano y animal.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta adjunta.**
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por mínimo 15 minutos, cubra el ojo afectado y lleve al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y bañe al paciente con abundante agua y jabón y lleve al médico.
- En caso de intoxicación por inhalación, retire la víctima de la zona de contaminación, lleve al aire libre y mantenga al paciente acostado de medio lado y vigile que éste respire.
- **No induzca el vómito.**

GUIA PARA EL MÉDICO

- Medidas de descontaminación general, si ha sido ingerido, practicar lavado gástrico, terminando con carbón activado y sulfato sódico.
- No hay un antídoto específico, por lo tanto, cualquier tratamiento debe ser sintomático.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (aserrín o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y deseche acorde con la entidad local competente.
- No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar. Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua en el área tratada.
- No contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos o envases vacíos.
- Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquiera otra área que requiera protección especial, 10 metros (terrestre) y 100 metros (área).
- **Lleve el envase al centro de acopio más cercano del programa campo limpio, luego de realizar el triple lavado.**

EN CASO DE INTOXICACIÓN, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM:

LÍNEA 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL TEL. (091) 2 88 60 12.
LÍNEA BAYER S.A DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.

Categoría toxicológica: III - Ligeramente peligroso
*Clasificación Recomendada por la Organización Mundial de la Salud.

Formulado por:

Bayer S.A.S. Bayer CropScience
Línea 018000111212
Bogotá, D.C., Colombia
®Marca Registrada

