



PRODUCTO
Plenexos Care WG
TIPO DE PRODUCTO
Insecticida agrícola
EMPAQUE AUTORIZADOS
Tarros plásticos 76 y 150 gr, bolsas de polietileno o metalizadas por, 1, 2, 3, 4, 5, 10,15, 20, 60 y 25 kg; bolsas de polietileno o metalizada por 75, 80, 100,125,200,250, 300, 400, 500, 600. 750, y 800 gr.
FORMULACIÓN
Gránulos Dispersables en Agua (WG)
INGREDIENTES ACTIVOS / CONCENTRACIÓN
Spidoxamat: 48 g/Kg
MODO DE ACCIÓN
Sistémico
NÚMERO DE REGISTRO NACIONAL
PL0004542024
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA*
Banda Azul IV – Ligeramente peligroso *Clasificación Recomendada por la Organización Mundial de la Salud.
¿QUÉ ES?
PLENEXOS® CARE WG es un insecticida sistémico de uso agrícola. Su ingrediente activo Spidoxamat actúa translocándose vía xilema y floema, perteneciente al Grupo IRAC 23 , inhibidores de la biosíntesis de lípidos (acetyl-CoA carboxilasa) en los insectos, para el control de plagas como trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>) y paratrioza de la papa (<i>Bactericera cockerelli</i>).
BENEFICIOS
• Insecticida sistémico que se transloca vía xilema y floema. • Perteneciente al Grupo IRAC 23, facilitando su uso en programas de rotación. • Eficaz para el control de trips y paratrioza de la papa en los cultivos registrados. • Periodo de reentrada de 4 horas, según etiqueta.





INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

No aplique durante la floración ni cuando se constate actividad de abejas.

CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO
AGÍTELO ANTES DE DESTAPAR Y USAR EL PRODUCTO

PLENEXOS® CARE WG es un insecticida sistémico de uso agrícola. Su ingrediente activo Spidoxamat se transloca vía xilema y floema. Pertenece al Grupo IRAC 23, actuando como inhibidor de la biosíntesis de lípidos (acetyl-CoA carboxilasa) en los insectos, para el control de plagas en los cultivos registrados.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC ¹	PR ²	L.M.P. (PPM)
ORNAMENTALES** ROSA CRISANTEMO* CLAVEL*	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1,5 Kg/ha Equivalente a 1,25 g/L	No aplica	4 horas	No aplica
PAPA	Paratrioza (<i>Psilido de la papa</i>) <i>Bactericera cockerelli</i>	0,75Kg/ha	7 días	4 horas	0,09*** Spidoxamat

NA: No aplica
1 PC: Periodo de Carencia: tiempo entre la aplicación y la cosecha 1 día
2 PR: Periodo de reentrada: Al secar el follaje (SF): tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado 4 horas.



FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

PLENEXOS® CARE WG, en ornamentales, realizar aplicación en aspersión foliar con volúmenes de aplicación de 1200 litros de agua por hectárea. Realizar máximo 2 aplicaciones por ciclo productivo, en bloque con frecuencia de 5 a 7 días dependiendo del nivel de infestación. Las aplicaciones deben iniciar con las primeras infestaciones de trips.

En papa, realizar aplicación en aspersión foliar con volúmenes de aplicación de 400–600 litros de agua por hectárea. Realizar máximo 2 aplicaciones en bloque por ciclo de cultivo con frecuencia de 7 días. Iniciar las aplicaciones cuando se presenten las primeras ninfas.



COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

PLENEXOS® CARE, antes de realizar mezclas deben realizarse previamente pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar (miscibilidad y fitocompatibilidad) en pequeña escala. Se recomienda el uso de adyuvante de uso agrícola para su aplicación.

PLENEXOS® CARE en las dosis y frecuencia recomendadas es compatible con los cultivos registrados. Sin embargo, se recomienda realizar pruebas de fito-compatibilidad en nuevas variedades y/o híbridos.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS.

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN. NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL. NOCIVO SI SE INHALA.

- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular, mezclar el producto y aplicar el producto: guantes, gafas, camisa manga larga, pantalón largo y zapatos resistentes; para ingresar al área tratada antes de terminar periodo de reentrada: camisa manga larga, pantalón largo y zapatos



resistentes. Si necesita realizar alguna actividad que esté en contacto con la superficie tratada use guantes.

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.
- No emplear utensilios domésticos para medir o mezclar el caldo de aspersión.
- Usar instrumentos de medición adecuados y previamente marcados para su fácil identificación.
- No mezclar el producto o la mezcla con la mano.
- Verificar el buen estado del equipo de aplicación y calíbrelo previamente.
- No sople con la boca las boquillas obstruidas; utilice un cepillo para destaparlas.
- No permita animales en el área tratada.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No re-envase el producto.
- No almacenar en casas de habitación.
- Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).
- Transpórtelo solamente con productos agroquímicos, separado de productos de consumo humano y animal.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: EN CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS. NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN. NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL. NOCIVO SI SE INHALA.

En caso de intoxicación

- Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta adjunta.

En caso de contacto con los ojos,

- Lave con abundante agua tibia por mínimo 15 minutos, cubra el ojo afectado y lleve al paciente al médico.

En caso de contacto con la piel,

- Retire la ropa y bañe al paciente con abundante agua y jabón y lleve al médico.

Si es inhalado,

- Retire la víctima de la zona de contaminación, lleve al aire libre y mantenga al paciente acostado de medio lado y vigile que éste respire. Suministre oxígeno o respiración artificial si es necesario.

En caso de ingestión,

- **NO induzca el vómito.** Siempre que haya disponibilidad de atención médica inmediata, lleve al paciente lo antes posible junto con esta etiqueta.

EN CASO DE PERSISTIR LOS SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN, ACUDIR AL MÉDICO, LLEVANDO LA ETIQUETA DEL PRODUCTO.

GUÍA PARA EL MÉDICO

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta adjunta.





MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (arena, diatomita o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y deseche acorde con la entidad local competente.
- No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar. Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua en el área tratada.
- No contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos o envases vacíos.
- Respetar las franjas de seguridad en relación a cuerpos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquiera otra área que requiera protección especial, 10 metros (terrestre).

LIGERAMENTE PELIGROSO – 4

Franja Azul



*** LLEVE EL ENVASE AL CENTRO DE ACOPIO MAS CERCANO DEL PROGRAMA CAMPO LIMPIO AGRICULTURA LIMPIA, LUEGO DE REALIZAR EL TRIPLE LAVADO ****

