

||||| FICHA TÉCNICA

Suspensión Concentrada - SC
Anilino-Pyrimidine
Fungicida Agrícola
Uso agrícola
Registro Nacional ICA No. 2339
Titular del registro: Bayer S.A



Siganex®

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Pyrimethanil: 600 g/L
de formulación a 20°C

Ingredientes aditivos:

c.s.p. 1 litro

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
AGÍTESE ANTES DE USAR

SIGANEX® SC 60 es un fungicida de ingrediente activo Pyrimethanil, del grupo químico de las anilino-pyrimidinas, de acción preventiva con efecto translaminar, que inhibe la secreción de enzimas requeridas para el proceso de infección.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS DE PRODUCTO COMERCIAL	P.C	P.R.
BANANO	Sigatoka Negra <i>Mycosphaerella fijiensis</i>	0.5 L/ ha	0 días	4 horas*
PLÁTANO	Sigatoka Negra <i>Mycosphaerella fijiensis</i>	0.5 L/ ha		
UCHUVA	Moho gris <i>Botrytis cinérea</i>	0.8 - 1 L/ha	14 días	4 horas

*PC: Periodo de Carenia: días entre la última aplicación y la cosecha

*PR: Periodo de reingreso: tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas y/o animales al área o cultivo tratado.

Se podrá ingresar al cultivo dos (2) horas después de la última aplicación del plaguicida químico de uso agrícola, siempre y cuando exista previa autorización del agrónomo responsable técnico del cultivo, que verifique que el follaje esté seco y se utilicen los elementos de protección personal descritos en la etiqueta para la aplicación del producto. Este procedimiento deberá registrarse en la bitácora del cultivo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Banano y Plátano: Se recomienda la aplicación de SIGANEX® SC 60 para el control de la Sigatoka Negra (*Mycosphaerella fijiensis*) en cultivos de banano y plátano, se puede utilizar en emulsión con agua-aceite ó en suspensión adicionando el producto al aceite, a la dosis recomendada por el fabricante del aceite. Al igual que los demás fungicidas, se recomienda la aplicación de SIGANEX® SC 60 en las primeras horas de la mañana.

Uchuva: Aplicar con los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda la aplicación de SIGANEX® SC 60 con base en los resultados del monitoreo del hongo. SIGANEX® SC 60 debe ser aplicado dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas - FRAC y complementando con prácticas de manejo integrado de cultivo.



COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Antes de efectuar mezclas debe realizarse previamente pruebas de compatibilidad (miscibilidad) y fito-compatibilidad con el producto que se desea mezclar.

SIGANEX® SC 60 en las dosis y frecuencia recomendadas, es compatible con los cultivos registrados, sin embargo se recomienda pruebas de fito-compatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- PELIGROSO SI ES INHALADO. EVITE RESPIRAR (POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN).
- CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS.
- Nocivo si es ingerido. Evite el contacto con los ojos o la piel. No aspire sus vapores o la neblina de aspersión, use máscara de protección respiratoria.
- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular y aplicar el producto: guantes, camisa manga larga, pantalones largos y calzado resistente y para ingresar al área tratada antes de terminar el periodo de re-entrada; camisa manga larga y pantalón largo, calzado resistente.
- **No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.**
- **Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.**
- Verificar el buen estado de los equipos de aplicación; calibrelo previamente.
- Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua en el área tratada.
- No permita animales en el área tratada.
- **Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No re-envase el producto. No utilizar este envase para ningún otro propósito.**
- No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).
- Transpórtelo solamente con productos agroquímicos, NO con productos de consumo humano y animal.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y bañe el paciente con abundante agua y jabón. Consulte al médico si los síntomas persisten o aparecen.
- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua por mínimo 15 minutos, cubra el ojo afectado y lleve el paciente al médico.
- Si ha sido ingerido, lave la boca con agua. No induzca el vómito. Mantenga al paciente animado, caliente, al aire fresco y en posición de descanso hasta obtener ayuda médica. Llevar el paciente al médico llevando el envase con usted.
- Si ha sido inhalado, remueva el paciente del lugar de exposición a un sitio con aire fresco y en posición de descanso. Llevar el paciente al médico llevando el envase con usted.

GUÍA PARA EL MÉDICO:

- No se recomienda lavado gástrico.
- Tratamiento sintomático y de sostén.

||||| MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (aserrín o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y deseche acorde con la entidad local competente.
- No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar. Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua en el área tratada.
- Respetar las franjas de seguridad en relación a cuerpos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquiera otra área que requiera protección especial, 10 metros (terrestre) y 100 metros (área).
- No contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos o envases vacíos.
- **Lleve el envase al centro de acopio más cercano del programa campo limpio, luego de realizar el triple lavado.**

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN, EVITANDO SALPICADURAS. LUEGO INUTILICELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN**

EN CASO DE INTOXICACIÓN, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM:

LÍNEA 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL TEL. (091) 2 88 60 12.
LÍNEA BAYER S.A DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.

Categoría toxicológica: III - Ligeramente peligroso

Formulado por:

Bayer S.A.S. Bayer CropScience

Línea 018000111212

Bogotá, D.C, Colombia

®Marca Registrada

