

||||| FICHA TÉCNICA

Suspensión Concentrada (SC)
Fluopyram / 500 g/L
Nematicida
Uso agrícola
Registro Nacional No. 1843
Titular del registro: Bayer S.A



VERANGO
PRIME



COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:
Fluopyram / 500 g/L
Ingredientes aditivos:
c.s.p. 1 litro

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:


Respetar dosis de etiqueta. No aplicar más de 500 g i.a/ha al suelo en la misma área, en el mismo año calendario.
CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO
AGÍTELO ANTES DE DESTAPAR Y USAR EL PRODUCTO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	¹ P.C.	² P.R.
BANANO	Nematodo barrenador (<i>Radopholus similis</i>)	1,0 L/Ha en drench, dirigida al suelo entre la madre y el hijo de sucesión.	0 días	4 horas*
TOMATE	Nematodo agallador (<i>Meloidogyne spp</i>)	0,5 l/ha Realizar una aplicación en drench a los 14 días después del trasplante	100 días	4 horas

¹P.C. **Periodo de carencia:** tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

²P.R. **Periodo de re-entrada:** tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas y/o animales al área o cultivo tratado.

Se podrá ingresar al cultivo dos (2) horas después de la última aplicación del plaguicida químico de uso agrícola, siempre y cuando exista previa autorización del agrónomo responsable técnico del cultivo, que verifique que el follaje esté seco y se utilicen los elementos de protección personal descritos en la etiqueta para la aplicación del producto. Este procedimiento deberá registrarse en la bitácora del cultivo.





FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar una única aplicación de VERANGO® PRIME por campaña, considerando un máximo de 1 L /ha/año. La aplicación debe realizarse de acuerdo con el monitoreo de la plaga, siendo recomendado aplicar cuando se observen poblaciones iguales o mayores a 10000 nematodos x 100 gramos de raíces. Este manejo debe ser complementando con prácticas de manejo integrado de cultivo.

En el cultivo de Banano, la aplicación se realiza en drench, dirigido al suelo entre la madre y el hijo de sucesión, el volumen de mezcla recomendado para la aplicación es de 100 cc/planta (tomando como base 1700 plantas promedio por hectárea, equivalente a 169 Litros de agua más 1L de VERANGO® PRIME).

En el cultivo de tomate utilizar un volumen de agua de 50 cc por planta. Ej: Para una densidad de siembra de 20.000 plantas por hectárea mezclar la dosis recomendada (VERANGO® PRIME 0,5 L/ha) en 1000 litros de agua. (100 cc de producto por caneca de 200 litros).

Si la densidad de siembra es diferente se debe ajustar el volumen de agua de acuerdo con la densidad de siembra. Se recomienda que el suelo esté húmedo al momento de la aplicación.



COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Antes de realizar mezclas con VERANGO® PRIME, deben realizarse previamente pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar y fito-compatibilidad, en pequeña escala.

VERANGO® PRIME en las dosis y frecuencia recomendadas, es compatible con los cultivos registrados, sin embargo, se recomiendan pruebas de fito-compatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- PELIGROSO SI ES INHALADO. EVITE RESPIRAR (POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN)
- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular: guantes, camisa manga larga, pantalón largo y calzado resistente y para aplicar el producto y para ingresar al área tratada usar camisa manga larga, pantalón largo y calzado resistente.
- **No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.**
- **Después de aplicar el producto, báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.**
- Verifique el buen estado del equipo de aplicación y calíbrelo previamente.
- No sople con la boca las boquillas obstruidas; utilice un cepillo para destaparlas.
- Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua en el área tratada.
- **Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No re-envase el producto, NO reutilice el envase para ningún propósito.**
- No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).
- Transpórtelo solamente con productos agroquímicos, NO con productos de consumo humano y animal.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (aserrín o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y deseche acorde con la entidad local competente.
- No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar. Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua en el área tratada.
- Tóxico para aves. No permita animales domésticos en el área tratada.
- Respetar las franjas de seguridad en relación a cuerpos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquiera otra área que requiera protección especial: 10 metros (terrestre).
- **Lleve el envase al centro de acopio más cercano del programa campo limpio, luego de realizar el triple lavado.**

EN CASO DE INTOXICACIÓN, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM:

LÍNEA 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL TEL. (091) 2 88 60 12.
LÍNEA BAYER S.A DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.



Categoría toxicológica: II - Moderadamente peligroso
*Clasificación Recomendada por la Organización Mundial de la Salud.

Formulado por:

Bayer S.A.S. Bayer CropScience
Línea 018000111212
Bogotá, D.C, Colombia
®Marca Registrada

